

*Habitat in Virginia.*

*Magnitudo A. terrestris. Alæ apice nigricantes.*

4punctata FORMICA rubra, abdomine nigro: punctis quatuor albis.

*Habitat in Germania. D.D. Fabricius.*

*Corpus Form. rubra minus, rubrum.*

*Squama intergerina integra, pone acumen thoracis.*

*Abdomen subrotundum, nigrum, glabrum: Puncta 2, alba, rastinata, paria, in dorso versus basim. Puncta 2 atia, alba, paria, paulo majora, remotiora, in medio dorso:*

Ianio CULEX ater, alis hyalinis, tibiis albis +

*Habitat in provincia Panat, Wallachia confini, Boves occidens. M. T. Brunniche*

*Corpus atrum, magnitudine majoris Pediculi; affinis C. Equino.*

*Thorax gibbus. Abdomen ovatum.*

*Fitmora nigra, basi albida. Pedes toti longiusculi.*

*Tibiae maximam partem albæ, apice fulceæ.*

*Planta nigra: Digitæ articulis nigris. Ungues minutus.*

helvola PODURA rufa cylindrica.

*Habitat confertissima gregaria in campis super gramina tenuiora, muscos tæpe obruens, vix satiens sed parce.*

tinicus CANCER brachyurus, thorace aculeato spinis XXXII, maculis dorsalibus fuscis, palmis posticis evatis.

*Habitat in China.*

*Thorax subovatus, depresso-ovalis, spinosus.*

*Spina marginem posteriorem cingentes 6 (utrinque 3), validiores.*

*Spinae in anteriore parte, utrinque longitudinales 4: ultima umbone cincta.*

*Spinae antice prominentes 9: intermedia elatiore; antepenultimis distantioribus.*

*Spinae ad latera antica, utrinque 2, parvae.*

*Puncta in dorso medio, longitudinalia 5 s. 6, eminentia.*

*Pedibus orbicularium.*

*Frons fere transuersa.*

*Cibæ laxes, latere superiore serrata spinis 3.*

M